

Uwaga! HPAI

**ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA
PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)**



Nie karm drobiu na zewnątrz
budynków inwentarskich.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach
bez możliwości swobodnego poruszania się
po otwartym wybiegu.

Nie wykorzystuj do pojenia drobiu
wody ze zbiorników,
do których mają dostęp dzikie ptaki.

Po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami
umyj ręce wodą z mydłem.

Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach
z budynków, w których
utrzymywany jest drób
oraz przy wjazdach i wyjazdach
z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynki,
w których utrzymywany jest drób
oraz paszę przed dostępem
zwierząt dzikich, w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących objawach
natychmiast powiadom
lekarza weterynarii.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia

wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności